

felszíni formákkal, itt a ciklus újra kezdéséhez nincs szükség újabb erő, emelkedés vagy süllyedés közbelépésére. A folyó az endogén erők változása nélkül is talál a felszínen akadályokat, amelyek az egyenesből kitérítik, kanyargásra kényszerítik.

A kanyarulatok tanulmányozása arra is rávezetett bennünket, hogy a folyókat életerejük szerint csoportosítsuk. Alföldünk folyóinak egy része erejének teljességében van: ilyenek a Tisza és mellékfolyói. Más része, forrásaitól elvágva, csak tengődik a régi mederben vagy újabb mesterségesen épített csatornában. Ilyenek a Hortobágy, a Kösely, a Kadarcs és félig ilyen a Berettyó. Ezeket neveztük féleleven folyóknak. A harmadik csoportban az egészen kiszáradt régi erek tartoznak; legfeljebb egy-egy mesterséges csatorna gyűjti össze bennük egy-egy szakaszukon, főleg tavasszal, a környék belvizeit. Ilyenek a Veker, a Kórógy, Fűrjér, Sertésér stb. Teljes névsorunk igen hosszú volna és nem tartozik szorosan tárgyunkhoz.

Két tényre azonban rá kell mutatnunk, anélkül, hogy jelen alkalommal bővebb tárgyalásukba bocsátkozhatnánk. Az egyik az alföldi közigazgatási határoknak a vízrajzhoz való alkalmazkodása. Egész különleges, meglepő törvényszerűségek bontakoznak itt ki.

A másik tény nagyrészt az elsőből következik: A folyómedrek változásának alapos tanulmányozása alkalmas arra, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsen a geológiai és történelmi időszámítás között.

Egyikük sem fér el jelen értekezésünk keretében.

A Veker folyó fejlődéstörténete.

Irta: Zalatay Elemér dr.


A Veker mai állapota, vízbősége messze alatta marad az ármentesítés előttinek, természetes tehát, hogy a Körös—Tisza-szög mai vízvidéke is egészen megváltozott, az ősi állapothoz képest.

A pleisztocénben a Maros törmelékkúpjának csaknem valamennyi vize ennek a területnek tartott, mert a folyó törmelékkúpja a síkságra lépéskor a jobbparton fejlődhetett és alakulhatott ki jobban. A balpart Agyalkútig 140 m magas, viszont a jobbon hamarabb útát talál az Alföldre. Érthető tehát, hogy a Tisza völgyében Szarvastól Hódmezővásárhelyig, sőt azon is túl húzódó lapos területet a Maros tölti ki vízzel és hordalékanyaggal.

A törmelékkúp eredeti mederhálózata igen bonyolult, ma már csak főbb vonalaiban tudjuk megrajzolni. Valószínű, hogy a ma

már elmosódott vízfolyások a pleisztocénban a Maros ágai voltak.¹ A kinyomozható főbb ágakat 2. sz. rajzunk tünteti fel.

Arra, hogy a Maros a Hármaskörös torkolatvidékére miként nyomult előre, Szentes földrajzában már rámutattam.² A Tisza—Körös—Maros együttes munkájának eredménye, hogy területünkön három jellegzetes tájformát különböztethetünk meg: sodrásterületet, rögvideket és lápvilágot. A felosztás nemcsak geológiai és genetikai tényezőkre támaszkodik, hanem a térbeli szemlélet is jelentős különbségeket fedez fel az egyes tájegységeken. A sodrási terület talaja kötött és vizet csak korlátozottan átbocsátó, ezért növénytaka-



1. ábra. — A szabályozás előtti állapot az 1832/42. felvételek alapján.

rója dúsabb, elevebb és színompásabb. A lápvilág tófenekén szikes és szikfoltos agyagok és sókkal telített területek vannak, azokon a növényzet satnyább, az éghajlati kilengésekkel szemben érzékenyebb. Kultúrnövényei a nedvességre és a szárazságra erősen érzékenyek, így a tájképi hatás is különböző.

Rögvideknek összefoglalóan a vízátbocsátó területeket nevezhetjük, de azok nem fedik mindig a kartográfiai ábrázolást és a térbeli szemlélet sem felel meg teljesen az agrogeológiai, avagy vízműszaki megállapításoknak. Mindazonáltal nagyjában mégis egyező, egymást kiegészítő eredményre jutunk, akár a terület geológiai viszonyait, akár annak esésviszonyait ábrázoljuk.


Részletezésükbe bocsátkozni itt indokolatlan. Folyófejlődéstörténetünk megalapozásához elég ennyi is. Csupán azt jegyezzük

¹ Zalotay: Területünk érhálózatának keletkezése. — Aranykalász, 1935. évf. 2. szám, 30—31.

² Szentes tájai és felszínalakulása. — Csongrádmegyei Könyvtár, 12. sz.

még meg, hogy az ármentesítés a vidéket 37 vízgyűjtő területre tagolta s ezzel a belső csapadék fölöslege elvezetésének kérdését a lehető legjobban megoldotta. Igaz, hogy ezzel eredetileg egységes vízvidékeket darabolt fel, egymáshoz nem tartozó medencéket kapcsolt össze s ezzel a területet természetes állapotából kiforgatta. Ez a lényegen semmit sem változtat, mindössze arra lehet iskolapélda, hogy miként válhat maga az ember is igen jelentős földrajzi tényezővé.

Az előbbi változásokat 5. számú vázlatunk tünteti fel — előre-
láthatólag nem sokáig, — egyben pontosan kijelöli annak a terület-




2. ábra. — 1. Ma is meglevő vízfolyások; 2. mai száraz medrek; 3. feltételezett mederszakaszok; 4. folyami eredetű homoksávok.

nek határait, amelyen a Veker folyó fejlődéstörténetét nyomozva, az alábbi eredményekre jutunk.

A Veker nemcsak Szentés, hanem az egész Körös—Tisza—Maros szögének egyik legnagyobb vízgyűjtője. Nagyobb a Korogynál, sőt a Szárazér-porgányinál is. Érendszere pompásan beleilleszkedik a szomszédos ér és csatornahálózatba. Négy nagy vízgyűjtő-medencét egyesít. Ezek közül a terehalmi—mucsíhádi mocsáron önzetlenül osztozik a Koroggal és annak a terület nagy részét átengedi. Csak a veresegyházi két ágon át szív el a maga részére kevés vizet. Ezt a két ágat tekinthetjük az ázott Veker forráságainak. A két ág az ősi folyó egyik teljesen zárt kanyarulatát csatornázza.

A veresegyházi felső és alsó csatornák összeömlésénél a Veker


délnek, majd egy teljes fordulattal északnak kanyarodik. A felszínen azonban kitűnik az ősi folyó medrének ellentétes irányba haladó, további szakasza is. Ez a korábban említett huroktól északra a Gödényhalom felé tart, azt megkerüli, anélkül, hogy a Gödénylappos-sal érintkezést tartana fenn, visszahajlik a Térdes, Csicsó, Hármas és Kisdáshoz. Itt elenyészik. A medernek Horgostér a neve addig, amíg hajlását el nem éri, onnan Térdesnek nevezik. Ez az ág a



3. ábra. — Geológiai viszonyok.

Veker egyik természetes forráságának volna tekinthető, ha a veres-egyházi két csatorna találkozáspontjánál egy másik jólképzett meder nem vezetne tovább keletre. Ez azonban hamarosan délre kanyarodva, újabb hurokot ír le, abból megint kiegyenesedik, hogy Cserebökölynél és Terehalomnál egy-egy kanyarulatot alkosson. Az utolsó kanyarulatból kibontakozva Lajoshegyesnél újból kanyart ír le s ennek vége a terehalmi laposban, a Mogorós-halomtól nyugatra vész el. A második meander azonban a mucsiháti lapossal és a Búsérrel tart fenn érintkezést.

A folyó eredeti állapotában tehát egyfelől a terehalmi lapos délnyugati végéből és a mucsiháti mocsár, illetőleg a Bűsér-tó északi szegletéből nyerte vizeit. Innen kiindulva, medrét egyre jobban ki-képezte. A forrás vidékének ez a része ma már nem tartozik hozzá, mert azt a Bűsérén át a Korogyhoz kapcsolták. Vizeit ma csak a Cserebökény, Veresegyház vidékéről gyűjti addig, amíg a veres-



4. ábra.

egyházi alsó és felső csatornával természetes medre nem találkozik. A vályú térszínmagassága itt általában 80.5 m, körüli.


Az elvesztett vízterületet a műszaki megoldás olyan vidékek bekapcsolásával pótolta, amelyek nem voltak rendes érintkezésben a régi folyóval. Ilyen a Gödénylapos, Atracstó és Telekér. Ezeket a vizeket voltaképpen a kúnszentmártoni Nagyér átömlése vidékéhez kell számítani, de mivel az áradások vize a Nagyér külső partvonalának magassága és erodátlan volta miatt nem folyhatott le, azokat csatornahálózattal a Csökönyéren át a Vekerbe vezették.

általában 85 m-t meghaladja, de vannak 86—89.5 m fölé emelkedő táblás részei is, azokon a halom 95.5 m-t ér el. Ezt a táblás rögzöt kerüli meg a Veker mély mederben az előbbi és a Kajáni rögvídek között. Itten a legmélyebb és legjobban kiképzett a folyó ágya és legkifejezöbben szemlélteti az egykori Veker vízbőségét, erejét és munkabírását. Az így képződött Vekerzug közepén, az Ágoshalmi környéki rög és a Nagytőkei táblán ülő Jámborhalom között egy eliptikus alakú, a Vekerzug egész közepét kitöltő medence terül el. Teljesen lefolyástalan terület annak ellenére, hogy magassága nem süllyed a 83 m alá. Magassága megakadályozza, hogy az árvizek elérjék, vagy a csapadékon kívül más vízpótlást kapjon. Nedves esztendőben valóságos belső, magas tóvá dagadt és az északnyugatra elterülő Csurgó medencéhez hasonlóan, fertőskátyukkal volt tele, amíg a víz el nem párolgott.

A Veker Kajántól délre levő kanyarulatától befogott terület a Vekerzug. Nem szabad a tőle délre levő Vekerlapossal összetéveszteni. A Vekerzug a sodrásterülethez, az utóbbi a rögvídekhez tartozik. A két tájék között általában 5 m-es szintkülönbség van. Amanak átlagos magassága 79.5—80 m, emennek 84—85 m. A kis fennsíknek 90 m fölé emelkedő részein kívül 83 m alá nem süllyedő lefolyástalan medencéi is vannak. Talaja laza, homokos, vizet könnyen átbocsátó, ezért a medencék mindegyikét csatornázni kellett. A táj a Nagyhegyhez hasonlít, azzal tökéletesen azonos eredetű és rétegződésű. Mielőtt a Nagyhegy homokbucka eredete mellett dönténénk, át kell vizsgálnunk a Vekerzugot, mert az a rögvídek eredetere és szerkezetére kifejezöbb bizonyítékokkal szolgál. (L. 6. sz. ábra.)

Komoly bizonyítékokat szolgáltat a Veker multjára vonatkozóan az ú. n. Hosszúszek környéke. Látszólag a Nagyjaksorér vízrendszerehez tartozik, de alaposabban figyelve a térszín alakulását s az esésviszonyokat, kiderül, hogy nem sok köze van hozzá. Északnyugati fokát 60 m széles, 85.5 m magas gerinc választja el a Nagyjaksorértől. Ez a ma 3—4 km hosszú lefolyástalan vályu igen sajátos jelenség területünk ábrázatán. Iránya északnyugati, délkeleti és a Köttönyhalom közelében délre húzódik. Nem egységes meder, hanem három részre tagolódo medencesor, benne a szikesedés jelei mutatkoznak annak ellenére, hogy talaja nem kötött s a csapadékvizet hamar elissza. Fenékmagassága legmélyebb pontján is 8 méter. Két méterrel magasabb, mint a Nagyjaksorérés és 3 méterrel, mint a Vekeré. Esése a Veker felé mutat. Ugyanerre a folyásirányra lehet következtetni a medencesor összetevődése folytán előálló meder hajlásából is. (L. 7. számú ábra.) Ez ugyanis egy ellipszis szeletére emlékeztet, egyik fókuszában a Köttönyhalom áll, amennyiben a vályu folytatását megtaláljuk a halomtól északra is. Mivel a Nagyjaksor is elliptikus pályájú, úgy látszik, mintha két ellipszis végével egymásba fonódna. Csakhogy míg az egyiknek fenékmagassága 81 m, a másiké 83 m. Két m szintkülönbség van tehát a medencék között, jelöl annak, hogy az egyik


— a Nagyjaksor — sokkal fiatalabb, mint a másik. Pedig a Nagyjaksor is régi, a Körös elhalt kanyarulata. Ha pedig figyelembe



7. ábra. — Hosszúszerk és környéke.

vesszük a két ellipszis ellentétes hajlását, nyilvánvaló, hogy a két folyónak egymásba kapcsolódó kanyarulatával állunk szemben. Ez az egymásbafonódás azonban nem jelent egykorúságot. Akkor, ami-

ezután felgyülemelő csapadékvíz megmaradt benne s a talajt kilugozta. Ezért kapta nevét is. Csapadékosabb években, esetleg rendkívüli áradásokkor, az akkor képződött Nagyjaksorér fölös vizének átömlése nyomán, a tőle délre fekvő, vele egy szintben kimaradó nagytőkei plató felszínén újabb láposodásfolyamat indul meg, ugyanolyan mély sebhelyeket marva a felszínbe, mint amilyeneket a Csorgónál, vagy a vekerzugi Fertőnél láttunk. De mert erre a területre a csapadékon kívül többé már más víz nem igen juthatott, a lepusztulás nem haladhatott olyan mértékben előre, mint a lápvilágban, ahonnan a Vekeren kívül a Korogy is szállított vizet. Hogy a Hosszúszéknek, illetőleg a fennsík lefolyástalan területének valamilyes



9. ábra. — A Veker belsőecseri hajlata.

Csorgó-szerű lefolyása mégis volt, arra az 1784-ben készült József császári felvétel bizonyíték, mert az a nagytőkei vasútállomásnál egy tavat jelez. Ennek délfelé lefolyó ere Belsőecsernél ömlik a Vekerbe. Ugyanakkor északról egy másik ér ömlik a tóba, az pedig nem lehet más, mint a Hosszúszék.

A Veker fejlődését ezen a szakaszon igen jól ki lehet nyomon követni. Különböző korszakokban leszakadt kanyarulatokkal találkozunk, ezért a Hosszúszékot I. fázisnak jelöljük. Fiatalabb medre a Vekerenek a Serfőzőhalmi kanyarulat. Fenekének legmélyebb pontja 82 m, egy m-el mélyebb, mint a Hosszúszék, kettővel magasabb, mint a Veker. Ez az elhalt meder tehát a Veker fejlődésének a Hosszúszék után következő szakából való. Jól meg lehet figyelni, hogy a folyó fejlődésének ma még megállapítható II. fokozatába is az I-el azo-

nos folyásiránya van a víznek. Ez is jellegzetes kanyarulat, csak jóval kisebb és keskenyebb az előbbinél, ami szerintünk nem a vízbőség csökkenésére, hanem az erozió előhaladása nyomán elért keményebb talajrétegre vezethető vissza. Megerősíti ezt a feltevést az is, hogy a meder nem volt hosszú életű, mert csak felületesen tudott kifejlődni. Valószínű, hogy a víz hamarosan új medret ásott magának. (L. 9. sz. ú. n. belsőcseri hajlat.)

A két kihalt kanyarulat jelöli azt a pontot, ahol az ősi Veker folyása megtört és kelet-nyugati irányból délre fordult. Fejlődésének ebben a korszakában az ár sokkal nagyobb lendülettel tartott keletről nyugatra, mint később, amikor éppen ezen a tájon elveszti erejét s a következő fázisban egészen alsófolyás jellegűvé válik. Tele van kanyarulatokkal, sűrűn érintkezik tavakkal és lápokkal. A Korogy hatása mutatkozik ezután. A Korogy a lapterület lecsapolásában, minden jel szerint, sokkal nagyobb szerepet játszott, mint a Veker. Ezért innen induló medre a Vekernél jobban ki is fejlődött. Lápvilágunk felületét a Korogy sokkal nagyobb mértékben pusztította le, mint a Veker.

A serfőzőhalmi kanyarulat életében a Veker és Korogy közeli érintkezése még nem lehetett meg, mert a víz sodra munkabíró és erőteljes. A vízváltató átszakadása azonban már közelgett. Mihelyt ez bekövetkezett, a Veker árja sokat veszített munkaerejéből. Lendülete gyengül, medrének húrja petyhüdtté lesz s alsófolyás jellegű ágakkal kanyarog délkelet felől északnyugatnak, míg azelőtt, ősi maradványaiból következőleg, iránya kelet-nyugati volt.

A magasabb térszintről alacsonyabbra való húzódásával, valamint folyásirányának eltolódásával kétségtelenül igazolja, hogy vizét a Kákafokon át nem a szarvasi Körös kanyarából kapta, hanem a Kondoros és Csikós éren át a keleti érhálózatból. De ugyanakkor kapcsolatban volt az egykori Körössel is éppen itt, ahol a történelmi időkben ilyen érintkezésről mitsem tudunk. A kanyartól északra ugyanis egy lapos vályu tart az Atracs tó felé. Ez a tó lényegében az Öskörös kanyarulata, a Veker fejlődésének II. szakaszából. Sajátságos azonban, hogy a Vekernak a Körössel való itteni érintkezése — éppen úgy, mint a Dögös—Kákafokon át — nem a Körösből való átömlés nyomait őrzi, hanem fordítva, az Ósvekerből való vízáradás emlékeit. A fokok medre ugyanis mindig a Körös felé mélyül, az erozió ott a legnagyobb s általában az egész mederfejlődés a Körös felé tartó vízmozgásról tanuskodik. Ez a tény nagyjelentőségű és igazolja a pleisztocénkori vízviszonyokra vonatkozó felfogásunk valószínűségét.

De van ezen kívül még egy jelentősége. Arra figyelmeztet, hogy a Veker olyan vidékről is kaphatott vizet, ahol a csapadékvízviszonyok a Körös vízgyűjtő területével nem voltak megegyezők. Az már aztán közömbös, hogy a Körös áradása előtt, vagy után történt ez a vízáradás, de úgy látszik, hogy a Körösnek történő vízáradás meglehetősen nagy munkabírású és huzamos időtartalmú lehetett.

Meg kell még néhány, a 75.000-es térképről hiányzó meder-


maradványról emlékeznünk. Ilyen a Belsőecseri hajlat is. Egészen új a folyónak az ármentesítés előtt még élő, baloldali kanyarulata. Fenékmagassága 81 m. Egy m-rel magasabb, mint a Veker mai medre. Tehát a folyófejlődés III. szakaszát képviseli. Szinte teljes hurkú hajlat, vízválasztóját az ármentesítés előtti Veker vizei is könnyen áttörhették. Hogy nem mérnöki munka eredménye az átvágás, igazolja a József császári felvétel, mert az már 1784-ben is így rajzolja a folyót. A mederfejlődésnek ebből a korszakából való a felszakaszozon következő többi kanyarulat is. Ugyanebben a szintben van a veres-egyházi, teremajori kanyar, a veresegyházi, cserebökényi és terehalmi hajlat is, míg az ezektől északra levő gödényoldali Horgas-ér, Térdes- és Hármás-, valamint a Csökönyér a II. szakasz maradványai. Csupán a hasonlat kedvéért azt is mondhatnánk, hogy az I. a fellegvári, a II. a városi terraszt képviseli, míg a III. a közelmúlt emléke.

Általában úgy látszik, hogy a Veker fejlődése során északról délnek vándorol. Az ősi medret ma már nem tudjuk kimutatni, de néhány megmaradt töredékéből ítélve, lápvilágunk északi peremén húzódott, melyből az ár a tőle délre fekvő síkokon elterülve, a talajt fellazította, kimarta és lassankint lepusztította. Így a folyó időről-időre magasabban fekvő kanyarulataitól búcsút vett, délre vándorolt, míg végül iránya is megváltozott. Felsőfolyásának délkelet-északnyugati irányú kialakulás-lehetősége arra utal, hogy a lápvilágba torkoló folyó nem északkelet, tehát a mai Hármaskörösből, hanem egyenesen keletről, a Csikoséren át hozta a szükséges vizet.

Felvetődhetik az a kérdés, hogy ha a lepusztulás ilyen nagymérvű, hogyan lehet, hogy a lerakódásnak és feltöltésnek még a nyomát sem tudjuk kimutatni. Szerintünk ez a körülmény is csak azt bizonyítja, hogy területünk a vízpótlást nem a közelből, hanem távolról kapta s hogy ez nem alkalmoszerű, időszakos, hanem állandó jellegű volt.

A Veker fejlődésének II. szakaszából való vízfolyás a Nádashalmiér. Ma már csak nyomai látszanak. Neve sem eredeti, hanem tőlünk származik. Ezen a területen különben lépten-nyomon találkozunk az I. és II. szakaszból való, elmosódott ősmeder-maradványokkal és magasan fekvő vízállásos helyekkel. Ilyen kifíalakú medencesor van a Nádashalomtól északra. Fenékmagassága 82 m, míg a körülötte húzódó menedékes partok 84 m magasak, a halom pedig 89 m. Ebből a medencéből egy rövid vályú kanyarog északra, egy másik pedig délnek tart és a Vekerbe torkollik. (L. 10. sz. vázlat.) Mederjellegük ma már teljesen elhalványodott, régen elhaltak, a fenékmagasságból következtetve, a II. szakaszhoz tartoznak. A medencét névtelenül jelzik az ármentesítés előtti térképen, de ki- és befolyó ereit nem ismerik. A József császári felvétel jelzi ugyan, de az meg a tavat nem ismeri. Ez ősi mederrészek szerint területünk eredeti felszínét sokkal magasabban kell keresnünk, mint az jelenleg van.

Csökönyér. A szabályozás előtti térképeink a Vekertől északra, szabályos patkó alakú tónak rajzolják. Ez ábrázolás téves, mert a terület nem lefolyástalan és főként nem állóvíz medencéje. Valóságos meder, amint a neve is világosan mondja. Hajlása is elárulja, hogy melyik folyó elhalt kanyarulata. Fenekének legmélyebb pontja 82 m, azonos magasságon van tehát a serfőzőhalmi kanyarulattal. Ugyancsak a régi térképek északi fokától nyugatra két másik kis medencét is feltüntetnek, fenékmagasságuk 82.5 m. Eszerint a Csökönyér nem tó, hanem egykori medre a Veker ősi morotvája. Olyan elhalt kanyarulat, amilyenről középkori okleveleink is gyakran megemlékeznek. Fekvése, alakja és környezete igen emlékeztet a



10. ábra. — Nádashalmiér, Csököny- és Horgasér.

IV. Bélának a nyulszigeti apácák számára kiállított 1266. évi birtokmegegerősítő levelében Áron Morvaje-jára.¹ Anélkül, hogy ezt az adatot vele azonosítanók, csupán azért említjük meg, mert az ilyen azonosító oklevéltári nevek lényegére rávilágítsunk. Ugyancsak IV. Bélának az egri egyház birtokait és jogait megerősítő 1261. évi okirata is említ egy ilyen Halastou-t, meg Asvautou-t.² A középkori levelekben említett helyek valahol ezen a környéken voltak és ha pontosan nem is azonosíthatók a Csökönyér, vagy a tőle nyugatra fekvő Szikessel, avagy az északra elterülő Gödénylappal, messze

¹ Fejér: Cod. Dipl. IV. III. 319. — Jerney: Magy. Nyelvkincsek 6. I. — Ortvay: Magyarország vízi. I. k. 93. I.

² Fejér: Cod. Dipl. IV. III. 40. I. — Jerney i. m. 7. I. — Ortvay i. m. I. 97. és 364. I.

nem lehettek tőlük, mert a régi Halásztelek község is ezen a környéken volt.

Az ér eredetileg nem volt érintkezésben a Szikessel, sem a Gödénylapossal, de magas vízválasztóval sem különült el tőlük. Ezért lehetett az ősi Veker kanyar nyugati szárán végighúzódó ú. n. Csökönnyér—Atrács csatornát könnyen megnyújtani és egy mellékcatorna segítségével a Gödénylapos vizeit is ezen az árkon át a Vekerbe levezetni. Maga a főcsatorna a Lapos nyugati felében nyugatnak fordul, majd északnak törik, hogy a Rédei dűlön ismét nyugatra térülve, az Atrács tóba kapcsolódjon. Ennek északi kakanyarulatát vízmentesíti, míg ugyanakkor déli felét a Telekhalmi mellékcatorna és az Atrács-Csonkaág vezeti le.

Az ú. n. csökönnyér—atrácsi főcsatorna tehát merőben ellentétes vízterületeket fűz össze és kapcsol a Veker vízgyűjtőjébe. Egyedül a Csökönnyér természetes része annak, míg a Gödénylapos, de különösen az Atrács tó a Körös vízvidékéhez tartozik. A Csökönnyérnek keleti szára nincs csatornázva. Ez elhalt meder, esésviszonyai északra, a kanyar foka felé mutatnak, ahol a vályú legmélyebb pontja is van. Onnan kezdve a morotva nyugati szárán vezet a mesterséges árok. Az esésviszonyoknak ilyenén való alakulása is azt igazolja, hogy az élő víz keletről nyugatnak tartott és a kanyar fokánál örvénylett.

Szikes. A Csökönnyértől nyugatra elterülő 82.5 fenékmagasságú kis medence. Nem volt érintkezésben sem az érrel, sem a Gödénylapossal, így a benne felgyülemelő csapadékvizek a talajt kilúgozták, innen a neve.

Gödénylapos. Kelet-nyugati irányban elhúzódó, elliptikus medence a Vekertől északra. Fenékmagassága 82 m. Egykor állandóan vízállásos terület, de semmi nyoma sincsen, hogy valaha is érintkezést tartott volna fenn a Vekerrel. Annak terraszos ösmedreitől is — mint a Csökönnyér, Horgasér — elég széles, de alacsony vízválasztó különíti el. Nincsen nyoma annak sem, hogy az Atrács tóhoz kapcsolódott volna. Attól szabályszerű gerinc választja el. Ezzel szemben elhalt vízfolyás mutat északra, a Horga völgye felé. A Gödénylaposvég és Gödényalj között ma már nincs kapcsolat, de mégis úgy látszik, hogy a Lapos a Szomjuhát és Feketehalom között húzódó árkon keresztül kapott, vagy adott vizet a Horga-völgynek. Mindkét meder ősi és minden jel szerint egykorú a Veker II. szakaszával.

Ennek a Laposnak vizeit csapolja le az ú. n. Gödénylaposi mellékcatorna. Szabályos, különböző szögekben megtörő, hosszú ásott meder, észak felől csatlakozik a csökönnyér—atrácsi főcsatornába, majd keletre fordul s ezt a főirányt jobbra-balra való törései közben is állandóan megtartja mindaddig, amíg a Lapos végét el nem éri.

Atrács tó. Eppen olyan kifejező és sajátos emléke területünk régi vízrajzának, mint a Hosszúszerék. Attól északra fekszik, azzal ellentétes irányú hurkot írva le. Lényegében nem tó, hanem

akkor állott kapcsolatban, amikor az fejlődésének II. fokozatában volt. A Nagyérrel tehát nem lehet rokonságba hozni. A két meder között, ha ugyanannak a folyónak szülöttei is, nagy különbség van, mint térben a 2 m-es szintkülönbség fejez ki, távolabbi kapcsolatokat pedig a Veker felől jövő ú. n. Atrácsi csonkaág szemléltet. A meder szélessége határozottan bizonyítja, hogy a Körös kanyarulata. Hasonlót találunk a Horga völgyében, míg a Kiritó ér már fiatalabb morotva-nemzedéke a Körösnek és a Nagyérnek édes testvére.

Az Atrács tó és Horgavölgy között a kapcsolatot ma már kimutatni nem lehet. Nem is volt az más, mint az Öskörös medre, mely vagy e messze elkalandozó két gyermekét tagadta meg, vagy maga vándorolt el tőlük. A hajlatok ivéből következő, ez az utóbbi a valószínűbb. Az ívek húrja u. i. sokkal kisebb annál, hogyszem az anyafolyó nagyon távol lehetne tőlük. Ami különösen megragadja a figyelmünket, az az a körülmény, hogy az öskanyarulatok mederszélessége valamivel keskenyebb, mint a későbbi Nagy és Kiritóé. Az utóbbiakban sokkal több víz folyhatott, mint az előbbieken. Ugyanezt tapasztaljuk a Veker ősmedrei esetében is. A Veker III. szakaszához tartozó Belsőecseri hajlata ugyancsak szélesebb medrű, mint a serfőzőhalmi és hosszúszéki. A hasonlóságot akkor vehetjük jól észre, ha megfigyeljük a Körösnek a Kiritó, Nagyér és nagyjaksoréri morotvát, s ezeket összehasonlítjuk a szabályozáskor levágott holtmedrekkel.

Valóban úgy látszik, mintha a Körös fejlődésében is három fokozatot lehetne megkülönböztetni. Volt egy régi, amelyikben kisebb volt a víz annál, amelyik a széles, de lapos Nagyeret stb. kialakította, azután pedig újra megcsappan a víz, mert munkája keskenyebb mederbe szorul. Kérdéses azonban, hogy e mederformák közötti különbség a víz mennyiségére, a kifejtett munka időtartamára, avagy a talaj szilárdságára vezethető-e vissza.

Ugy látjuk, hogy nincs semmi különösebb bizonyíték arra, hogy a Körösnek a tárgyalt három korszak valamelyikében is nagyobb vízmennyisége lett volna, mint ma. Hogy mégis különböző méretű medreket hozott létre, annak oka csakis a munka időtartamának különbözősége és a talaj változása volt az oka. Tudjuk, hogy a talajban a homokrétegek közé beágyazva keskenyebb és vastagabb lösz-, agy agyagcsíkok vannak. Feltárásunk helyén a 84 m magasságban levő lösz 5.70 m vastagságot is elér. Ez alatt a rövid, de annál erősebb és nagy munkát kifejtő áradás homokja következik, amelyet 20.75 m vastag kékagyag lerakódás zár le.* A szelvény összetétele és folyómedreink különböző korbeli szélessége között, mi okozati összefüggést látunk, s egy olyan talajszelvényre következtünk a 82 m térszín fölött, amely ma már ki nem mutatható területünkön, mert áldozatul esett a denudációnak.

* Lásd: Szentes tájai és felszínalakulása 40—44. l.-t. Az altalaj rétegződésének krónikája c. fejezetét.

Ez a körülmény földrajzi szempontból igen érdekes támpont-hoz segít. A neolithikus kultúra ugyanis eleven víz nélkül megenni nem igen tudott. Létfeltétele volt a tó, ér és folyó. A törzsek halász és vadász kultúrája tehát mindig mederhurkokban és parti rögökön húzódott meg, sőt azokat az árhullámoktól védve, szemetével is emelte. A ma élő vizektől ilyen távol, mint amilyenre előbbi elhalt medreink fókuszában lévő halmaink fekszenek, nem szokott megtelepedni a csiszoltkőkori ember. Hogy mégis találkozzunk emlékeivel, az annak a jele, hogy az ő korában a medrek még élő vízzel voltak tele. Sőt! Halmaink legnagyobb része, akár a Kőttöny-, akár a Sertőző- vagy Nádashalmot nézzük, avagy tovább megyünk a Gödény, a Nádas II., Csikos, Kovács és még keletebbre, a Szőr-, Kike-, Hajduvölgyi- stb. halmokhoz, egytől-egyig ilyen ősi, elhalt medrek, az utóbbiak pedig éppen pleisztocénkori őszereink partján fekszenek. E megfigyelések nyomán nem lehet kétséges, hogy területünk neolithikus kultúrája, vagy annak egy időszaka, egykorú az ősmedrekkel. Ha pedig a régészet ezeknek a kultúráknak virágkorát a K. e. III.—V. évezredekre teszi és a becslés helytálló, akkor ősmedreink korára vonatkozóan is felvilágosítást kapunk. Ime így adódik közös problémája a geográfiának az archeológiával. A kérdés pontos és helytálló megoldása mindkét tudomány számára igen fontos.

Nagyon messze vezetne, ha az előbbi módon folytatnók a Veker ősi vízfolyásainak vizsgálatát. Erre csakis önálló monográfia keretében nyílna alkalom. Az előadottakkal is megoldottuk feladatunkat és minden különösebb nehézség nélkül kirajzoljuk a Veker három különböző medrét.

Lehetőleg egyéb vízrajzi, morfológiai és településtörténeti kérdésekre most ne válaszoljunk. Hagyjuk nyitva a megoldásokat. Minél több oldalról irányul felénk e sorok nyomán a figyelem, annál kielégítőbb eredményhez juthatunk és kutatásainkat értékállóbbá tehetjük.

hanem valamennyi hulladékhalom. Az egy tiszafüredi Ásotthalom-ot kivéve, amely cölöpépítmény nyomait őrizte meg, a többi szabad tűzhelyű, nyitott tanyahely, amelyen az ember építmény mellőzésével élte kezdetleges életét. Ilyen volt területünkön a Ficsorhalom, éppen a Veker mellett, a Vekerlapos északkeleti partján. Fenti előadásunk számára a legkifejezőbb a nagykörösi ú. n. Nagypengyom-halom, amelyben több későbbi beletemetkezést találtak, de ugyanakkor a halom fenekén és lábánál elterülő földhátan nagyon sok őskori cserép hevert. Lásd Arch. Ért. 1879. XIII. 365—368.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK

LXVII. KÖTET.

1939. ÉVFOLYAM

SZERKESZTETTE:

HÉZSER AURÉL ÉS KÉZ ANDOR

VITÉZ TEMESY GYŐZŐ

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

KIADJA:

A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG.

BUDAPEST, 1939.

GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN
BULLETIN GÉOGRAPHIQUE
BOLLETTINO GEOGRAFICO
GEOGRAPHICAL REVIEW

VOL. LXVII.

ANN. 1939.

REDIGÉ PAR

AUREL DE HÉZSER ET ANDOR KÉZ

AVEC LA COLLABORATION DE

VITÉZ GYŐZŐ TEMESY

ÉDITÉ PAR LA

SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIE.

BUDAPEST, 1939.

„ÉLET” IRODALMI ÉS NYOMDA RT. BUDAPEST.